

阿多鹅观草——青海禾本科一新种

吴玉虎，卢生莲

(中国科学院 西北高原生物研究所, 西宁 810001)

摘要：对青海禾本科一新种——阿多鹅观草进行了形态描述并提供了相关照片。该种与矮鹅观草相近,但本种的基生叶叶鞘顶端两侧有披针形叶耳;叶片两面均密被短柔毛,上面及边缘还杂有长粗毛;穗状花序短,长约4 cm;花药草绿色,长约1 mm,可以区别。

关键词：中国；青海；鹅观草属；阿多鹅观草；新种

中图分类号：Q949 文献标识码：A 文章编号：1000-3142(2008)03-0285-03

Roechneria aduoensis ——A new species of the Family Gramineae from Qinghai, China

Wu Yu-Hu, Lu Sheng-Lian

(Northwest Plateau Institute of Biology, Chinese Academy of Sciences, Xining, 810001, China)

Abstract : *Roechneria aduoensis* S. L. Lu et Y. H. Wu, a new species of Gramineae from Zaduo County, Qinghai Province is described and provide its related photos. The new species is related to *R. humilis* Keng et S. L. Chen, but it is distinguished by the base sheath with auricles on top at the both sides; both surface pubescent densely, long-hirsute mixedly on adaxial surface and margins; spike is short, only 4 cm long; anthers straw-green, 1 mm long.

Key words : China; Qinghai; *Roechneria*; *Roechneria aduoensis*; new species

我们在为国家自然科学基金项目进行野外考察时,在青海省玉树州杂多县阿多乡采集到了鹅观草属的一个新种——阿多鹅观草,其生境为海拔4 680 m的河滩高寒草甸。

阿多鹅观草(新种) 图版

Roechneria aduoensis S. L. Lu et Y. H. Wu sp. nov. photo.

Species nova affinis *Roechneria humilis* Keng et S. L. Chen, sed apice vaginis auriculis manifestis; utrinque dense puberulis, supra et margine longi-hispida fortuito. Spica circ. 4 cm longa; antheris prasinus, 1 mm longis differt.


Perennis. Fibris numerosis tenuibus. Culmi laxe caespitosi, erecti, circ. 25 cm alti, glabri, saepeissime 2 nodes. Vaginae foliorum glabrae; auriculae basibus vaginae lanceolatae, circ. 1 mm lon-

guae; ligulae circ. 0.5 mm longae; laminae planae sapa margine involutae, 2 - 3 (- 5) cm longae, utrinque dense puberulae, supra et margine longi-hispida fortuito. Spica laxa, atropurpurea, circ. 4 cm longa (arista exclusa); rhachis tenuis, saepe serpentiana, rhachis internodiis circ. 5 mm longis; spiculae 12 - 20 mm longae (arista exclusa), solitariae in quoque nodo, saepe 3 - 4 flosculae, pedicellus 0.5 - 0.8 mm longae; rhachillis dense pubescentes, internodiis 1.5 - 2.5 mm longis; glumae lanceolatae, acuminate, glabrae, 5-nerves, gluma prima 4 - 4.5 mm longa, secunda 6 - 6.5 mm longa; lemmata oblongo-lanceolata, 5-nervia, costa scabrae, dorso utroque infra brevi-spinulosa, disco pilosis, aristis circ. 15 - 26 mm longis, scabrosis, reflexis; primo 12 mm longo; palea lemmate subaequales, apice rotundatus

* 收稿日期：2007-03-26 修回日期：2007-06-20

基金项目：国家自然科学基金(30470148) [Supported by the National Natural Science Foundation of China(30470148)]

作者简介：吴玉虎(1951-)，男，陕西咸阳人，研究员，主要从事植物系统分类和植物区系地理研究。(E-mail) yhwu@nwipb.ac.cn。



图版 阿多鹅观草 A. 模式标本；1. 叶鞘局部, 示叶耳；2. 顶生小花；3. 颖；4. 外稃；5. 内稃；6. 花药；7. 颖果。

Plate *Roegneria aduoensis* S. L. Lu et Y. H. Wu, sp. nov. A. Holotypus; 1. part of leaf sheath, showing auricles; 2. extreme floret; 3. glumes; 4. lemmas; 5. paleas; 6. anthers; 7. caryopsis.

ciliatus, 2-carinatus, 1/3 supra carina sparse ciliata, inferne glabrescentes; antherae prasinus, 1 mm longae.

青海 (Qinghai) : Zaduo County (杂多县), Aduo Xiang (阿多乡)。In alpine meadow and in gravel flood land, alt. 4 680 m. 2005-08-06, Wu Yuhu (吴

玉虎) 35 567-A (holotype, QTPMB) (Qinghai-Tibetan Plateau Museum of Biology, the Chinese Academy of Sciences = HNWP)。模式标本存中国科学院青藏高原生物标本馆)。

多年生草本。具多而纤细的须根。秆直立, 疏

丛生,高约25 cm,平滑无毛,通常具2节;叶鞘光滑无毛;叶耳披针形,长约1 mm;叶舌长约0.5 mm;叶片常内卷,长2~3(~5) cm,两面密被短毛,上面及边缘杂有长粗毛。穗状花序疏松,长约4 cm(芒除外),暗紫色,穗轴纤细,常呈蜿蜒状,节间长约5 mm;小穗长12~20 mm(芒除外),单生于穗轴每节,含3~4小花,具短柄,长0.5~0.8 mm;小穗轴密被短毛,节间长约2 mm;颖披针形,顶端渐尖,光滑无毛,具5脉,第一颖长4~4.5 mm,第二颖长6~6.5 mm;外稃长圆状披针形,具5脉,中脉粗糙,背下部两边具短刺毛,基盘具毛,顶端具长15~26 mm粗糙、反曲的芒,第一外稃长约12 mm;内稃近等长于外稃,顶端钝圆具纤毛,两脊上部1/3疏具纤毛,下部无毛;花药草绿色长约1 mm。花果期8月。

本种与矮鹅观草(*Roegneria humilis* Keng et S. L. Chen)相似,但其基生叶叶鞘顶端两侧有披针形叶耳;叶片两面均密被短柔毛,上面及边缘还杂有

长粗毛;穗状花序短,长约4 cm;花药草绿色,长约1 mm而可以区别(耿以礼,1959;杨锡麟等,1987;Wu & Wang,1999;Cai,1997,1999;陈守良等,2006)。所以,我们认为,该新种虽与后一种具有一定的亲缘关系,但其间的区别仍然非常明显,作为独立的新种应该能够成立。本种为中国特有种。

参考文献:

- 杨锡麟,王朝品. 1987. 中国植物志[M]. 北京:科学出版社,9(3):6~104
 陈守良,朱光华. 2006. 禾本科. 中国植物志[M]. 22:400~429
 耿以礼. 1959. 中国主要植物图说——禾本科[M]. 北京:科学出版社:342~409,421~429
 蔡联柄. 1999. 青海植物志[M]. 西宁:青海人民出版社,4:74~103
 Cai LB(蔡联柄). 1997. A taxonomical study the genus *Roegneria* C. Koch from China(国产鹅观草属研究)[J]. *Acta Phytotax Sin*(植物分类学报),35(2):148~177
 Wu YH,Wang QJ. 1999. Triticeae Dumort[A]. The Grasses of Karakorum and Kunlun Mountains[M]. 69~97

(上接第423页 Continue from page 423)

资料,分别对各峰加以鉴定,确认出20个组分。

4 讨论

按上述实验条件进样,得到细尖光苔萼挥发油的总离子流图。共分离出35个色谱峰,根据相应的MS谱图,通过数据库的质谱数据系统检索,并参考有关文献鉴定了其中20个峰的成分。以扣除溶剂峰的色谱图的全部峰面积作为100%,按峰面积归一化法计算各化合物在挥发油中的相对含量,结果见表1。

本研究从细尖光苔萼挥发油中共分离得到35个色谱峰,与别的植物相比,细尖光苔萼的挥发油中成分较少,鉴定出了20个成分,均为首次从该种植物中首次发现。其中2,4,5-三甲基苯乙酮、4-氨基-甲基-苯酚、榄香烯、1,1,7-三甲基-4-次甲基-1H-环丙基[e]甘菊环烃-7-醇等四种主要成分,占鉴定成分总含量的66.5%。在鉴定的化合物中,蒎烯具有广谱的抗真菌作用(李开泉等,1986),并且具有镇痉作用(国家医药管理局中草药情报中心站,1986)。榄香烯具有降低肿瘤细胞有丝分裂能力,诱发肿瘤细胞凋亡,抑制肿瘤细胞的生长的生物活性,现在已经处于临床应用(钱军等,1996)。通过对挥发油的成分进行研究,进一步揭示光苔萼的化学成分,为光

苔的开发与利用提供参考。

参考文献:

- 吴立军,吴继洲. 1988. 天然药物化学[M]. 北京:人民卫生出版社,5:261~266
 国家医药管理局中草药情报中心站. 1986. 植物药有效成分手册[M]. 北京:人民卫生出版社:182~183
 Asakawa Y. 1995. Chemical constituent of hepaticae. Progress in the Chemistry of Organic Natural Products [M]. Wein New York:Springer Verlag,65:562
 John W,van Klink,Josef Zappa,et al. 2002. Pinguisane-Type Sesquiterpenes from the South American Liverwort *Porella recurva* (Taylor) Kuhnemann[J]. *J Biosci*,57:413~417
 Li KQ(李开泉),Tang T(唐陶). 1986. Studies on antifungal effectual components of the essential oil of *Litsea cubeba*[山苍子油抗真菌有效成分的研究][J]. *Chin J Hospital Pharm*(中国医院药学杂志),6(11):3~4
 Qian J(钱军),Qin SK(秦叔逵). 1996. Antitumor dug-the pharmacological and clinical effect of elemene(抗癌新药——榄香烯的药理及临床)[J]. *Chin J Clin Oncol*(中国肿瘤临床),23(6):453~455
 Toshihiro Hashimoto,Hiroshi Irita,Masami Tanaka,et al. 2000. Pinguisane and dimeric pinguisane-type sesquiterpenoids from the Japanese liverwort *Porella acutifolia* subsp. *Tosana*[J]. *Phytochemistry*, 53:593~604
 Wang FQ(王凤强),Lou HX(娄红祥). 1997. Progress in the studies on chemical constituents and bioactivities of Mosses[J]. *World Phytomedicines*(国外医药(植物药分册)),6:1~5