

橐吾属新分类群

刘尚武 何廷农

(中国科学院西北高原生物研究所 西宁 810001)

New taxa of Ligularia(Compositae) from China

LIU Shang-Wu HO Ting-Nong

(Northwest Plateau Institute of Biology, the Chinese Academy of Sciences, Xining 810001)

Key words *Ligularia*; *L. cuneata* S. W. Liu et T. N. Ho; *L. virgaurea* (Maxim.) Mattf. var. *pilosa* S. W. Liu et T. N. Ho; New taxa; China

关键词 椴吾属; 楔舌橐吾; 毛黄帚橐吾; 新分类群; 中国

1 楔舌橐吾 新种 图 1

Ligularia cuneata S. W. Liu et T. N. Ho, sp. nov. Fig. 1

Species *L. retusae* DC. similis, sed caulibus superne pedunculisque breviter flavo-pilosus, corymbo composito differt.

Herba perennis, 70 ~ 100 cm alta. Caulis erectus, robustus, superne cum inflorescentia breviter flavo-pilosus, inferne glaber. Folia basilaria ignota; illa caulina petiolata, petiolo 8 ~ 14 cm longo, vagina inflata, 7 ~ 12 cm longa, usque 10 cm lata, submembrana, breviter albo-pilosa; laminae reniformes, 7 ~ 12 cm longae, 14 ~ 24 cm latae, apice retusae, margine triangulato-dentatae, dentibus apice cartilagineis, basi sinu lato, supra breviter albo-pilosae, subtus breviter flavo-pilosae, nervis palmatis. Corymbus compositus, ramosus; pedunculi circ. 8, breviter flavo-pilos, calathidiis 1 ~ 5 in quoque pedunculo; bracteae et bracteolae lineare-lanceolatae, 8 ~ 10 mm longae. Calathidium radiatum, numerosum, involucro campanulato vel hemisphaerico, 9 ~ 12 mm longo, 10 ~ 15 mm lato, basi flavo-piloso, phyllis numerosis, 2- seriatis, oblongis vel lancceolatis, 8 ~ 10 mm longis, 3 ~ 5 mm latis, apice acutis vel acuminatis, dorso breviter albo-pilosus vel glabris, margine ciliatis; corollae fl. foemineorum ligulatae, luteae, ligulis obovatis, oblanceolatis vel cuneatis, 7 ~ 8 mm longis, 3 ~ 6 mm latis, apice truncatis vel obtusis, 3 ~ 4-denticulatis, tubo 4 ~ 5 mm longo; eae fl. hermaphroditorum tubulosae, flavae, 6 ~ 7 mm longae, tubo circ. 2 mm longo. Achaenia ematura, pappis albis circ. 6 mm longis, corollae fl. tubulosi aequilongis.

China. Xizang (西藏): Gyirong(吉隆), stream and river banks, alt. 3750 m, 1972-06-13, Xizang Med. Pl. Exped. 227(holotype, HNWP).

多年生草本,高 70 ~ 100 cm。茎直立,粗壮,最上部及花序被黄色短柔毛,下部光滑。基生叶未见;茎生叶具柄,柄长 8 ~ 14 cm;鞘膨大,长 7 ~ 12 cm,宽至 10 cm,近膜质,被白色

*

1999-04-29 收稿,1999-06-30 收修改稿。

基金项目:国家自然科学基金资助项目(39670059)。




图1 楔舌橐吾 1. 茎上部叶；2. 花序；3. 头状花序；4. 舌状花。（王颖 绘）

Fig. 1 *Ligularia cuneata* S. W. Liu et T. N. Ho 1. Leaf of the upper stem; 2. Inflorescence; 3. Capitulum; 4. Ligulate floret.

短柔毛；叶片肾形，长7~12 cm，宽14~24 cm，先端凹陷，边缘有三角状锯齿，齿端具软骨质小尖头，基部弯缺宽，叶上面被白色短柔毛或近光滑，下面被黄色短柔毛，叶脉掌状。复伞房花序分枝；总花序梗约8，每个总花序梗具1~5个头状花序，被黄色短柔毛；苞片和小苞片线状披针形，长8~10 mm；头状花序辐射状；总苞半球形或钟形，长9~12 mm，宽10~15 mm，总苞片多数，2层，近等长，长圆形或披针形，长8~10 mm，宽3~5 mm，先端急尖或渐尖，背部被白色短柔毛或光滑，边缘有缘毛；舌状花黄色，舌片倒卵形，倒披针形或楔形，长7~8 mm，宽3~6 mm，先端平截或钝，具3~4齿，管部长4~5 mm；管状花黄褐色，长6~7 mm，管部长约2 mm。瘦果未熟；冠毛白色，长约6 mm，与花冠等长。

本种与黑毛橐吾 *Ligularia retusa* DC. 相近，但茎上部及花序梗被黄色短柔毛，复伞房花序等而不同。后者全株被黑色短柔毛，伞房花序或头状花序单生。

2 毛黄帚橐吾 新变种

Ligularia virgaurea (Maxim.) Mattf. var. *pilosa* S. W. Liu et T. N. Ho, var. nov.; in Fl. Reip. Pop. Sin. 77(2): 115. 1989, nom. nud.

A typo involucris dense flavo-pilosus differt.

Xizang(西藏)：Qamdo(昌都)，alpine meadow，alt. 4500 m，1973-07-22，Xizang Exped. (Qinghai Biol. Inst.) 2603 (holotype, HNWP). **Sichuan**(四川)：Garze(甘孜)，sunny slopes，alt. 3800 m，1960-07-25，Sichuan Med. Pl. Exped. 15255.

与原变种的区别是总苞被密的黄色有节柔毛。

(责任编辑 徐黎)